

Hora de llegada:

Preparación por la tarde con CLENPIQ

- **Debe acompañarlo un amigo o familiar, quien será el encargado de conducir y de llevarlo hasta su casa. NO le daremos de alta si se retira en taxi, autobús u otro servicio de transporte sin la compañía de una persona responsable. No podrá conducir hasta el día siguiente del procedimiento.**

Instrucciones especiales sobre medicamentos

- Si está tomando un **anticoagulante**, nuestra enfermera se comunicará con usted para darle instrucciones después de haberse contactado con el médico que le recetó el medicamento. Si la enfermera no se ha comunicado una semana antes del procedimiento, llame a nuestra oficina.
- **No tome suplementos de hierro durante una semana antes** de la fecha del procedimiento. Sí puede tomar multivitaminas.
- **Los pacientes diabéticos:**
- **No** deben tomar **diuréticos** (Lasix [furosemida], HCTZ [hidroclorotiazida], Dyazide, Diovan HCT, espironolactona), el día del procedimiento.
- **Sí pueden** tomar **medicamentos para el corazón, tensión arterial, tiroides, convulsiones o ansiedad el día del procedimiento** con un sorbo de agua.
- **Deben suspender el Effexor un día antes** del procedimiento (si corresponde).
- Los **pacientes asmáticos** deben traer sus **INHALADORES** el día del procedimiento.

EL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO

IMPORTANTE: Siga las instrucciones a continuación, pero NO siga las instrucciones del paquete que vienen con la preparación

- **PUEDE desayunar liviano hasta las 11:00 a.m.**
(p. ej., huevos revueltos, una tostada de pan blanco o jugo de naranja. NO puede ingerir cereales)

integrales ni de otro tipo, avena, etc.).

- **NO PUEDE COMER ALIMENTOS SÓLIDOS DESPUÉS EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO.; SOLO LÍQUIDOS TRANSPARENTES.**
- Tome todos sus medicamentos habituales, **a menos que se le haya indicado lo contrario.**

- **A las 6 p.m.:** Sí No Tome 2 comprimidos de Bisacodyl laxante con agua **2** horas antes de la primera dosis de la preparación.
- **A las 8 p.m.:** Tómese una botella de **CLENPIQ** (directamente de la botella)
- Tome todo el líquido del recipiente.
- **DEBE** tomar CINCO (5) recipientes más de 8 onzas de líquido transparente durante las 2 horas siguientes.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO

- Tome la segunda dosis de la preparación **seis (6) horas** antes de dirigirse al centro donde se le realizará la endoscopia.
Por ejemplo, si piensa salir a las 1:00pm., debe tomar la segunda dosis a las 7:00 a.m.
- Tómese la segunda botella de CLENPIQ (directamente de la botella)
- Tome todo el líquido del recipiente.
- **DEBE** tomar CINCO (5) recipientes más de 8 onzas de líquido transparente durante las 2 horas siguientes.
- **DEBE** tomar toda la preparación 4 horas antes de llegar.

Acuérdese de rellenar y traer los documentos de color café con usted al procedimiento.

PUEDE BEBER LÍQUIDOS TRANSPARENTES HASTA 4 HORAS ANTES DE LLEGAR, PERO LUEGO NO PODRÁ BEBER MÁS LÍQUIDOS.

Para realizar preguntas generales o reprogramar el procedimiento, llame al 610-431-3122.