

Tu colonoscopia está programada para el siguiente:

Instrucciones de preparación de Clenpiq

Etapa 1

- **Consume líquidos claros solo (ver lista más abajo) el día antes del procedimiento**
- A las 15:00 del día antes del procedimiento, toma 2 comprimidos de Dulcolax (5 mg cada uno)
- A las 17:00 del día antes de tu procedimiento, bebe una botella entera de Clenpiq prep. Durante las próximas 5 horas, bebe 5 vasos adicionales de líquidos claros de 8 onzas, a tu propio ritmo.
- Una vez completada la Fase 1, continúa consumiendo líquidos claros hasta que llegue el momento de la etapa 2 de la preparación.

Etapa 2

- **3 horas antes de la hora programada de llegada, bebe la segunda botella de Clenpiq prep y 3 vasos adicionales de 8 onzas de líquidos claros. Asegúrate de que la fase 2 se complete completamente en menos de 1 hora.**

Notas

- Puede que la preparación tarde unas horas en empezar a hacer efecto.
- Es normal sentirse muy lleno o hinchado durante la preparación. **Si experimentas náuseas y/o vómitos, espera 30 minutos antes de reanudar la preparación o los líquidos. Si el vómito no desaparece una vez que empieza a mover los intestinos, por favor llámenos inmediatamente para más instrucciones.**

LÍQUIDOS CLAROS ACEPTABLES

Gelados de agua con gelatina Kool-Aid

Limonada Zumos de fruta (**SIN** zumo de naranja) Refresco (todos)

Café negro (sin nata, miel ni azúcar añadidos) Té helado Té caliente (sin azúcar añadido ni miel)

No consumas líquidos de color rojo o morado, ya que pueden imitar sangrado en el colon

Es especialmente importante que leas esta información completa y llames para hablar con nosotros si no tienes claro alguna indicación.

El incumplimiento de las siguientes directrices podría suponer el retraso y/o cancelación de tu procedimiento sin cuestionamiento.

- Evita los suplementos de hierro durante 5 días antes del procedimiento.
- Evita comer pan y cereales integrales con frutos secos/semillas y maíz durante 5 días antes del procedimiento.
- No se permiten bebidas alcohólicas durante la preparación del colon ni después de medianoche la noche anterior a los procedimientos.
- **PRODUCTOS DE TABACO DE MASCAR, BOLSAS DE NICOTINA, FUMAR, VAPEAR E INHALAR MARIHUANA** (médico y recreativo) **ESTÁN PROHIBIDOS** Después de medianoche la noche anterior a tus procedimientos. También deberías evitar caramelos duros y chicles después de medianoche.
- Por favor, consulte las instrucciones personalizadas de medicación que le han dado en su visita a la consulta. **Es especialmente importante tomar medicamentos para la presión arterial y la función cardíaca el día del procedimiento.**
- Tú **DEBE** Que un conductor te den de alta para salir de la recuperación tras la anestesia. Tú **NO PUEDO** Usa UBER, LYFT, Healthride o MediVan a menos que una persona responsable viaje contigo como pasajero.
- Puede que tengas LÍQUIDOS CLAROS hasta 2 horas antes de la hora prevista en nuestra instalación.
- **Todos los estimuladores** (vejiga, espinal, etc.) Debe estar "apagado" o colocado en "modo quirúrgico".
- Si experimentas cualquiera de los siguientes momentos entre ahora y el día de tu procedimiento, **Por favor, notifícanos inmediatamente.**
 1. Un cambio en el estado de salud.
 2. Una visita a urgencias/ingreso hospitalario.
 3. Pruebas o visita a la consulta para el corazón, pulmones y cerebro.

Por favor, llame al 814-946-5469 Opción 7 para informar de estos cambios, o si tiene alguna pregunta adicional relacionada con su procedimiento.

DETENER LA MEDICACIÓN EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

Carafate (Sucralfate)

RETENGA LOS MEDICAMENTOS DURANTE 1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Byetta (Exenatide)

Soliqua (Lixisenatida + Insulina)

Victoza/Saxenda (Liraglutida)

RETENGA LOS MEDICAMENTOS DURANTE 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Brenzavvy (Bexagliflozin)

Farxiga (Dapagliflozin)

Glixambi (empagliflozina/linagliptina)

Inpefa (Sotagliflozin)

Invokana (Canagliflozin)

Invokamet (Canagliflozina/Metformina)

Invokamet XR (Canagliflozina/Metformina XR)

Jardiance (Empagliflozin)

Qtern (Dapagliflozin/Saxagliptin)

Qternmet XR (Dapagliflozina/Saxagliptina/Metformina XR)

Synjardy (Empagliflozina/Metformina)

Synjardy XR (Empagliflozina/Metformina XR)

Steglatro (Ertugliflozin)

Steglujan (Ertugliflozin/Sitagliptin)

Segluromet (Ertugliflozina/Metformina)

Trijardy XR (Empagliflozina/Linagliptina/Metformina XR)

Xigduo (Dapagliflozina/Metformina)

Xigduo XR (Dapagliflozina/Metformina XR)

RETENGA LA MEDICACIÓN DURANTE 7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Adipex-P/Lomaira (Fentermina)

Adlyxina (Lixisenatida)

Bydureon (Exenatide)

Mounjaro/Zepbound (Tirzepatida)

Ozempic (Semaglutida)

Qysmia (Fentermina y Topiramato)

Rybelsus
Trulicity (Dulaglutida)
Wegovy